

二级传染病

一级传染病

什么是麻疹？

由麻疹病毒感染引起的急性发热及出疹性疾病。

是一种**通过咳嗽、打喷嚏等飞沫和空气传播**的传染病，

对麻疹病毒**没有免疫力的人群与患者接触时感染率可达90%以上**，

但通过疫苗接种完全可以预防。

主要症状有哪些？

※ 潜伏期 7~21天（平均10~12天）

传染期

传染性强的时期



出现发热，咳嗽，
流涕，结膜炎，
口腔内
斑点等症状


出疹期

症状最严重的时期



脖颈后侧，耳朵下
方，躯干，四肢，
手和脚掌出现
红斑性皮疹

恢复期



皮疹消失后留下色
素沉着

*可能引发支气管肺炎，哮喘等呼吸道疾病，腹泻，急性脑炎等并发症。


二级传染病

一级传染病

海外旅行时预防守则是什么？

韩国虽已获得世界卫生组织（WHO）于2014年颁发的麻疹消除认证，但仍存在因**境外输入**导致国内出现病例及**小规模流行的可能性**。

旅行前



- **确认是否已接种两次**
MMR 疫苗（麻疹，腮腺炎，风疹）
- 如果没有接种记录或记不清楚，请在出国前至少4周前往医疗机构完成两剂次（间隔4周）接种。

旅行中



在人群聚集处
佩戴口罩



在流水中用肥皂
洗手30秒以上



咳嗽时
用衣袖遮挡口鼻

旅行后

出现疑似症状（发热，出疹）时

入境时



告知检疫官

前往医疗机构时



先给附近医院或诊所打电话
后再前往
*告知海外旅行史
佩戴口罩
避免利用公共交通
尽量减少与他人接触

二级传染病

一级传染病

什么是尼帕病毒感染病？

由尼帕病毒感染引起的人畜共患传染病
人类被感染时致死率高达40~75%，是一种尚无疫苗和治疗药物的危险疾病，
因此预防最为重要。

访问危险地区(国家)*时预防守则是什么？

- * 印度：2001~2025年共出现102例病例（72例死亡，致死率71%）
- * 孟加拉国：2001~2025年共出现347例病例（249例死亡，致死率72%）



注意避免**接触**
果蝠、
病猪等(野生)**动物**



谨慎饮用生枣椰树汁等**饮品**
或食用掉在地上的**水果**



避免**直接接触**
患者的血液或体液



养成**用肥皂洗手30秒以上**的习惯




不用污染的手**触摸面部**

二级传染病

一级传染病


主要症状有哪些？

初期症状



发热,头痛,咽喉痛,肌肉痛等非特异性症状

发展到重症时



出现眩晕,嗜睡,意识减退等神经系统症状

出现疑似传染病症状时？

✈️ 入境时 出现发热等疑似症状

向检疫官申报
提交Q-CODE（或健康状况调查表）



🏠 回国后 14天内出现发热等疑似症状

☎️ 联系1339疾病管理厅或辖区内保健所
商谈时告知海外旅行史

